

## PŘÍBALOVÁ INFORMACE PRO PACIENTA NA OBALU

### NÁZEV PŘÍPRAVKU SPECIES UROLOGICAE PLANTA

doplňková léčba při akutních infekčních chorobách močových cest

Léčivý čaj  
Perorální podání

### SLOŽENÍ

Betulae folium 27,5 g (březový list), Uvae ursi folium 22,5 g (medvědicový list), Polygoni avic. herba 11,0 g (nať rdesna ptačího), Ononidis radix 10,0 g (jehlicový kořen), Petroselini radix 10,0 g (petrželový kořen), Urticae herba 10,0 g (kopřivová nať), Millefolii herba 7,0 g (řebříčková nať), Sambuci nigrae flos 2,0 g (květ bezu černého) ve 100g čajové směsi.

### POUŽITÍ

Tradiční rostlinný léčivý přípravek užívaný jako doplňková léčba při akutních infekčních chorobách močových cest, které se projevují pálením při močení a častým močením. Působí močopudně, antisepticky (protibakteriálně), uvolňuje křeče hladkého svalstva.

Desinfekční účinek medvědice lékařské (*Uvae ursi folium*) je vhodně doplněn dalšími léčivými rostlinami, které zvyšují tento účinek a působí příznivě při onemocněních močových cest.

Přípravek mohou užívat dospívající od 12 let a dospělí.

Použití tohoto tradičního rostlinného léčivého přípravku je založeno výlučně na zkušenosti z dlouhodobého použití.

### PŘÍPRAVA A DÁVKOVÁNÍ

1 polévková lžice (5 g) se přelije šálkem (1/4 l) vařící vody, po 15 minutách vyluhování se scedí. Pro zvýšení účinku se doporučuje přidat po vyluhování na špičku nože užívací sodu. Čaj se pije teplý 3-5x denně. Přípravuje se vždy čerstvý, bezprostředně před použitím.

Přípravek se obvykle používá 1-2 týdny, pokud lékař neurčí jinak.

Bez porady s lékařem přípravek užívejte nejdéle 2 týdny. Pokud se příznaky zhorší nebo se nezlepší do 1 týdne, vyhledejte lékaře.

Léčbu je možno opakovat nejvýše 5 krát za rok.

### KONTRAINDIKACE

Neužívejte při přecitlivělosti na některou složku přípravku, při otocích způsobených nedostatečnou funkcí srdce a ledvin. Přípravek nesmí užívat těhotné a kojící ženy.

Nepodávejte dětem do 12 let.

### NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

U citlivých osob může vyvolávat žaludeční obtíže (nevolnost, zvracení), které po vysazení přípravku vymizí. Dále se mohou vyskytnout alergické kožní reakce.

### Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41, Praha 10, webové stránky:

[www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek](http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek).

Nahlášením nežádoucího účinku můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

### **INTERAKCE**

Neužívejte s léky a potravou snižující pH moči (zvyšující kyselost moči) např. kyselé šťávy.

### **UPOZORNĚNÍ**

Může způsobovat hnědé zbarvení moči.

Ošetřujícího lékaře informujte, že užíváte Species urologicae Planta.

Pokud se u Vás během užívání přípravku objeví krev nebo hnis v moči, bolest v podbřišku nebo horečka, poraďte se s lékařem.

Pokud příznaky onemocnění při používání tohoto tradičního rostlinného přípravku přetrvávají nebo pokud se objeví nežádoucí účinky nebo jiné neobvyklé reakce, vyhledejte lékaře.

Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za „Použitelné do“. Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

### **UCHOVÁVÁNÍ**

Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

### **VELIKOST BALENÍ**

Hmotnost náplně 100,0 g

### **REGISTRAČNÍ ČÍSLO**

Reg. č.: 94/625/69-C

### **Č.šarže**

### **POUŽITELNÉ DO**

### **DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A VÝROBCE**

LEROS, s.r.o.

U Národní galerie 470

156 00 Praha 5 – Zbraslav

Česká republika

e-mail: [leros@leros.cz](mailto:leros@leros.cz)

### **INFORMACE V BRILLOVĚ PÍSMU NA OBALU**

species urologicae

### **DATUM POSLEDNÍ REVIZE TEXTU**

10.5.2016