

## PŘÍBALOVÁ INFORMACE PRO PACIENTA NA OBALU

### NÁZEV PŘÍPRAVKU

#### **URCYSTON PLANTA**

Léčivý čaj

Perorální podání

Choroby močových cest

### SLOŽENÍ

Uvae ursi folium 0,375 g (medvědicový list), Equiseti herba 0,300 g (přesličková nat'), Myrtilli herba 0,225 g (borůvková nat'), Matricariae flos 0,150 g (heřmánkový květ), Sambuci nigrae flos 0,150 g, (květ černého bezu), Solidaginis herba 0,150 g (zlatobýlová nat'), Thymi herba 0,150 g (tymiánová nat') v 1 nálevovém sáčku.

### POUŽITÍ

Tradiční rostlinný léčivý přípravek užívaný jako doplňková léčba při akutních infekčních chorobách močových cest, které se projevují pálením při močení a častým močením. Působí močopudně, antisepticky (protibakteriálně), uvolňuje křeče hladkého svalstva.

Desinfekční účinek medvědice lékařské (*Uvae ursi folium*) je vhodně doplněn dalšími léčivými rostlinami, které zvyšují tento účinek a působí příznivě při onemocněních močových cest.

Přípravek mohou užívat dospívající od 12 let a dospělí.

Použití tohoto tradičního rostlinného léčivého přípravku je založeno výlučně na zkušenosti z dlouhodobého použití.

### PŘÍPRAVA A DÁVKOVÁNÍ

1 nálevový sáček se přelije šálkem ( $\frac{1}{4}$  l) vařící vody a po 10 minutách vyluhování v přikryté nádobě se vyjme. Ke zvýšení účinku se doporučuje přidat k nálevu na špičku nože zaživací sodu. Čaj se pije teplý 3-5x denně. Přípravuje se vždy čerstvý, bezprostředně před použitím.

Přípravek se obvykle používá 1-2 týdny, pokud lékař neurčí jinak.

Bez porady s lékařem přípravek užívejte nejdéle 2 týdny. Pokud u Vás příznaky onemocnění při používání tradičního rostlinného přípravku přetrvávají déle než 1 týden, poraďte se s lékařem.

Léčbu je možno opakovat nejvýše 5 krát za rok.

### KONTRAINDIKACE

Neužívejte při otocích způsobených nedostatečnou funkcí srdce a ledvin, při precitlivělosti na některou složku přípravku. Přípravek nesmí užívat těhotné a kojící ženy.

Nepodávejte dětem do 12 let.

## **NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY**

U citlivých osob může vyvolávat žaludeční obtíže nebo alergické kožní reakce, které po vysazení přípravku vymizí.

### **Hlášení nežádoucích účinků**

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41, Praha 10, webové stránky:  
[www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek](http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek).

Nahlášením nežádoucího účinku můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

## **INTERAKCE**

Neužívejte s léky a potravou snižující pH moči (zvyšující kyselost moči) např. kyselé šťávy.

## **UPOZORNĚNÍ**

Přípravek může způsobovat hnědé zbarvení moči.

Ošetřujícího lékaře informujte, že užíváte Urcyston Planta.

Pokud se u Vás během užívání přípravku objeví krev nebo hnis v moči, bolest v podbřišku nebo horečka, poradte se s lékařem.

Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem se poradte s lékařem.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za „Použitelné do“.

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

## **UCHOVÁVÁNÍ**

Uchovávejte při teplotě do 25 °C, v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

**VELIKOST BALENÍ**

20 nálevových sáčků po 1,5 g  
Hmotnost náplně 30,0 g

**REGISTRAČNÍ ČÍSLO**

94/133/89-C

Č.šarže

**POUŽITELNÉ DO****DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A VÝROBCE**

LEROS, s.r.o.  
U Národní galerie 470  
156 15 Praha 5 - Zbraslav  
Česká republika  
e-mail:leros@leros.cz

**INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU NA OBALU**

urcyston

**DATUM POSLEDNÍ REVIZE TEXTU 29.10.2014.**